

予 防 接種名	対 象 年 齢 (接種開始年齢として参 照してください。)	回 数 ・ 間 隔 等	
ヒブ（インフルエンザ菌b型）ワクチン	生後2か月から7か月に至るまで	4 回	<ul style="list-style-type: none"> ・初回：27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をおいて3回 ※標準的には27日から56日までの間隔をおいて3回 ※初回2回目及び3回目の接種は1歳に至るまでに行い、1歳を超えた場合は行わない。 (追加接種は実施可能) ・追加：初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回 ※標準的には初回接種（3回目）終了後、7か月から13か月までの間隔をおいて1回 ※初回接種を終了せずに1歳を超えた場合は、初回接種に係る最後の注射終了後27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をおいて1回
	生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまで	3 回	<ul style="list-style-type: none"> ・初回：27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をおいて2回 ※標準的には27日から56日までの間隔をおいて2回 ※初回2回目の接種は1歳に至るまでに行い、1歳を超えた場合は行わない。 (追加接種は実施可能) ・追加：初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回 ※標準的には初回接種（2回目）終了後、7か月から13か月までの間隔をおいて1回 ※初回接種を終了せずに1歳を超えた場合は、初回接種に係る最後の注射終了後27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をおいて1回
	1歳に至った日の翌日から5歳に至るまで	1 回	
小児用肺炎球菌ワクチン	生後2か月から7か月に至るまで	4 回	<ul style="list-style-type: none"> ・初回：2歳に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回 ※標準的には1歳までに27日以上の間隔をおいて3回 ※初回2回目の接種は1歳に至るまでに行い、1歳を超えた場合は3回目の接種は行わない。 (追加接種は実施可能) ※初回3回目の接種は2歳に至るまでに行い、2歳を超えた場合は行わない。 (追加接種は実施可能) ・追加：初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1歳に至った日以降において1回 ※標準的には初回接種（3回目）終了後、60日以上の間隔をおいて1歳から1歳3か月に至るまでに1回
	生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまで	3 回	<ul style="list-style-type: none"> ・初回：2歳に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回 ※標準的には1歳までに27日以上の間隔をおいて2回 ※初回2回目の接種は2歳に至るまでに行い、2歳を超えた場合は行わない。 (追加接種は実施可能) ・追加：初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて1歳に至った日以降において1回
	1歳に至った日の翌日から2歳に至るまで	2 回	<ul style="list-style-type: none"> ・60日以上の間隔をおいて2回
	2歳に至った日の翌日から5歳に至るまで	1 回	
子宮頸がん予防ワクチン	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間)	<p>サーバリックス（組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン） ※1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて合計3回接種</p> <p>ガーダシル（組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン） ※2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて合計3回接種</p> <p>シルガード9（組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン） 令和5年4月1日から接種できるようになりました。 ※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、1回目と2回目の接種は、通常6か月以上あけて合計2回接種 ※1回目の接種を15歳になってから受ける場合、2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて合計3回接種</p>	お問い合わせ先 健康対策課 電話：88-6610

【接種方法】 BCG以外は医療機関での個別接種となります。事前に診療時間内に連絡し、日時を予約してください。

町外の医療機関での接種を希望される方は接種前に子育て支援課までご連絡ください。

【費用】 無料（ただし、接種回数間違い等で任意接種となった場合の費用は自己負担となります。）

お問い合わせ先：宇治田原町 子育て支援課 電話：88-6636